



## Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners

Onderstaande richtlijn geldt tot de datum dat het testbeleid om iedereen te testen van kracht gaat. Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid met **zorgverleners** die aan **kwetsbare mensen thuis zorg verlenen**. Dat zijn:

- mantelzorgers;
- vrijwilligers in palliatieve zorg;
- pgb gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of -aanbieder.

**Kwetsbare mensen thuis** betreffen mensen die bij een besmetting een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn volgens het [RIVM](#):

- mensen van 70 jaar en ouder;
- volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen.<sup>1</sup>

### Uitgangspunten

Mantelzorgers, PGB gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg, kunnen getest worden als er sprake is van:

- direct patiënt -en cliëntcontact, en
- klachten die passen bij een COVID-19 besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).

### Testen

Voor deze zorgverleners gelden de volgende adviezen:

Indien de **zorgverlener** COVID-19 klachten heeft en de zorgverlener maakt geen deel uit van het huishouden van de cliënt:

- Zorgverlener belt GGD voor afspraak om te testen.
- GGD-arts doet triage en test indien noodzakelijk.
- Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door andere (professionele) zorgverlener.

Indien de **mantelzorger** COVID-19 klachten heeft en de mantelzorger is **inwonend**:

- Mantelzorger belt huisarts of GGD voor afspraak om te testen.
- Huisarts/GGD-arts doet triage en test indien noodzakelijk.
- Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door (andere) professionele zorgverlener.
- In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de leefregels conform verdachte patiënt in de thuissituatie (<https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot>).
- Indien de testuitslag positief is gelden voor de mantelzorger de leefregels conform een bevestigde patiënt in de thuissituatie (<https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis>). De zorg moet dan worden overgenomen tot de mantelzorger dit weer kan doen.

---

1. Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 te hebben, maar maatwerk moet mogelijk blijven in overleg met betrokken behandelaars. Soms is testen ook noodzakelijk bij crisisplaatsingen. Of vanwege een kwetsbare thuisomgeving.



**Specifiek voor de mantelzorger:**

Voor de mantelzorger is het laten overnemen van zorg soms lastig te regelen. De zorgladder voor mantelzorgers (zie hieronder) kan helpen te beziën welke ondersteuning de mantelzorger nodig heeft en kan krijgen. Meer informatie over de zorgladder vindt u op [Mantelzorg.nl](https://www.mantelzorg.nl). Deze ondersteuning is verder uitgewerkt in de [Richtlijn Mantelzorgondersteuning](#).

Zorgladder mantelzorg kent 5 treden:

- Trede 1: mantelzorg uit het eigen netwerk
- Trede 2: inschakelen van andere informele ondersteuning en vrijwilligers
- Trede 3: inschakelen van Wmo ondersteuning via gemeente
- Trede 4: inschakelen van verpleging en verzorging
- Trede 5: tijdelijke crisishulp en opvang elders via gemeente